

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
ПРОСТАНОРМ®

Регистрационный номер:

Торговое название препарата: Простанорм®

Лекарственная форма: экстракт жидкий для приема внутрь

Описание

Жидкость коричневого цвета с красноватым оттенком, ароматическим запахом. При хранении допускается появление осадка.

Состав:

Для получения 1000 мл препарата необходимо:

Зверобоя травы – 250 г

Золотарника канадского травы – 250 г

Солодки корней – 250 г

Эхинацеи пурпурной корневищ с корнями – 250 г

Спирта этилового (Этанол) 50 % – до 1000 мл

Фармакотерапевтическая группа: средство лечения хронического простатита растительного происхождения.

Код АТХ: G04BX

Фармакологические свойства

Препарат оказывает выраженное простатотропное действие за счет противовоспалительного, анальгезирующего, бактериостатического (стафилококки, энтерококки) эффекта. Простанорм® улучшает микроциркуляцию тканей предстательной железы, показатели эякулята (в т.ч. подвижность сперматозоидов) при патозооспермии и секрета предстательной железы на почве хронического простатита; нормализует мочеиспускание.

Показания к применению

Хронический простатит, бесплодие (патозооспермия) вследствие хронического простатита (в комплексной терапии), противовоспалительное и нормализующее мочеиспускание средство.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, острый гломерулонефрит.

С осторожностью: при заболеваниях, для лечения которых не рекомендуется использование иммуностимулирующих средств (препарат содержит экстракт эхинацеи).

Применение у детей

Эффективность и безопасность Простанорма® у лиц моложе 18 лет не исследована.

Способ применения и дозы

Внутрь по 1/2 чайной ложке (2,5 мл или 40 капель), разведенных в 50 мл воды, 3 раза в день за 30 минут до еды или через 40 минут после еды. Курс лечения до 4-6 недель. Проведение повторного курса лечения возможно после консультации с врачом.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Несовместимости с лекарственными препаратами других групп не выявлено. Лечение может сочетаться с применением биогенных стимуляторов, витаминов, антибактериальных препаратов, массажем предстательной железы и физиотерапевтическими процедурами.

Особые указания

Максимальная разовая доза препарата содержит около 0,7 г абсолютного спирта.

Форма выпуска

Экстракт жидкий для приема внутрь.

По 50 или 100 мл во флаконы темного стекла с винтовой горловиной, укупоренные пробками полиэтиленовыми и крышками пластмассовыми навинчиваемыми.

По 50 или 100 мл во флаконы темного стекла, укомплектованные мерными стаканчиками из полимерных материалов.

По 50 или 100 мл во флаконы-капельницы темного стекла, укупоренные полиэтиленовыми пробками-капельницами.

По 50 или 100 мл во флаконах темного стекла с колпачком-дозатором.

Каждый флакон, флакон с колпачком-дозатором или флакон-капельницу с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения.

В защищенном от света месте, при комнатной температуре (от 15 до 25°C).
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

4 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

Без рецепта.

Заявитель регистрации (владелец РУ)

ЗАО «ФПК ФармВИЛАР»

**Производитель/Фасовщик (первичная упаковка)/ Упаковщик
(вторичная (потребительская) упаковка)**

ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм»

Россия, 634009, г. Томск, пр-т Ленина, 211;

ФГУП «НПО «Микроген» Минздравсоцразвития России

Россия, 115088, г. Москва, ул. 1-ая Дубровская, 15

Адрес производства: Россия, 634040,

г. Томск, ул. Ивановского, 8.

ООО НПО «ФармВИЛАР»

Россия, 249096, Калужская обл.,

г. Малоярославец, ул. Коммунистическая, 115.

Организация, принимающая претензии:

ЗАО «ФПК ФармВИЛАР»

117216, Россия, г. Москва, ул. Грина, 7

тел./факс. (495) 712-10-81.