

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**РАНЕНИЯ И ЗАКРЫТЫЕ
ПОВРЕЖДЕНИЯ ОРГАНОВ
МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ**

1706 [Image of a long, multi-story building] 2001
ГЛАВНЫЙ ВОЕННЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЛАВНОЕ ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ГЛАВНЫЙ ВОЕННЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ
ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.Н. БУРДЕНКО

РАНЕНИЯ И ЗАКРЫТЫЕ
ПОВРЕЖДЕНИЯ ОРГАНОВ
МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ

*Материалы научно-практической
конференции*

21 сентября 2001 г.

Москва
ГВКГ им. Н.Н. Бурденко
2001

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ПростаНорм ПРИ РЕАБИЛИТАЦИИ РАНЕНЫХ И ПОСТГРАДАВШИХ С СОПУТСТВУЮЩИМ ПРОСТАТИТОМ

*Л.В. Шаплыгин, Н.Ф. Сергиенко, В.В. Исаев, В.К. Колхир,
Т.Е. Трумп, Д.М. Монаков*

Известно, что в ближайшем и отдаленном посттравматическом периодах у пострадавших, перенесших травмы, ранения, операции, нередко развивается воспаление предстательной железы, причинами которого являются длительный постельный режим, катетеризация мочевого пузыря, длительное половое воздержание и др. В 30-35% случаев показано медикаментозное лечение сопутствующего простатита.

Нами изучена эффективность препарата ПростаНорм, выпускаемого Всероссийским институтом лекарственных и ароматических растений (Москва) при реабилитации 57 пациентов в ближайшем (до 3 мес) посттравматическом периоде после ранений и закрытых повреждений органов брюшной полости и малого таза. Все пациенты предъявляли жалобы на дизурию, боль в промежности, у 42 (73,7%) человек было жжение в уретре после мочеиспускания, ухудшение самочувствия. У всех пациентов диагноз простатита был подтвержден данными лабораторных исследований секрета предстательной железы, пальцевым ректальным исследованием и УЗИ. Препарат назначался в стандартной дозировке.

На фоне приема препарата уже через 5-7 дней отмечалось значительное улучшение самочувствия и исчезновение симптомов простатита. Препарат оказывает выраженное противовоспалительное, антипролиферативное и антибактериальное действие, так как в его состав входит набор трав (корни солодки и эхинацеи, травы золотарника и зверобоя), являющихся иммуностимуляторами. При применении ПростаНорма мы отмечали его хорошую переносимость без каких-либо побочных явлений. Препарат оказался эффективным у 54 (94,7%) пациентов. Какого-либо отрицательного взаимодействия с другими препаратами отмечено не было.

Таким образом, препарат ПростаНорм может и должен применяться в комплексной терапии и реабилитационном лечении у больных после травм, ранений и операций с сопутствующим простатитом.