

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ  
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ПростаНорм®

**Регистрационный номер:** PN002282/01-130612

**Торговое наименование препарата:** ПростаНорм®

**Лекарственная форма:** таблетки, покрытые оболочкой

**Описание**

Круглые, двояковыпуклые таблетки, покрытые оболочкой от розового до розовато-красного цвета, допускаются светлые вкрапления.

**Состав.**

Каждая таблетка, покрытая оболочкой, содержит:

*Активный компонент:* ПростаНорм® экстракт сухой (получаемый из смеси лекарственного растительного сырья: зверобоя травы, золотарника канадского травы, солодки корней, эхинацеи пурпурной корневищ с корнями (1:1:1:1), с содержанием суммы флавоноидов в пересчете на рутин 5 %) – 200 мг.

*Вспомогательные вещества:* крахмал картофельный – 40,00 мг; лактоза – 149,98 мг; повидон К-30 – 4,00 мг; кремния диоксид коллоидный – 2,02 мг; магния стеарат – 4,00 мг.

*Оболочка:* сахароза – 225,16 мг, тальк – 3,04 мг, кремния диоксид коллоидный – 3,70 мг, титана диоксид – 4,75 мг, повидон низкомолекулярный К-17 – 3,56 мг, магния гидроксикарбонат – 44,26 мг, краситель Тропеолин «о» – 0,02 мг, краситель Азорубин – 0,06 мг, капсол 1400 – 0,45 мг.

**Фармакотерапевтическая группа:** средство лечения хронического простатита растительного происхождения.

**Код АТХ:** G04BX

**Фармакологические свойства**

Препарат оказывает выраженное простатотропное действие за счет противовоспалительного, анальгезирующего, бактериостатического (стафилококки, энтерококки) эффекта. ПростаНорм® улучшает микроциркуляцию тканей предстательной железы, показатели эякулята (в т.ч. подвижность сперматозоидов) при патозооспермии и секрета предстательной железы на почве хронического простатита; нормализует мочеиспускание.

### **Показания к применению**

Хронический простатит, бесплодие (патозооспермия) вследствие хронического простатита (в комплексной терапии), противовоспалительное и нормализующее мочеиспускание средство.

### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, острый гломерулонефрит, непереносимость галактозы и/или фруктозы, дефицит лактазы и/или сахаразы/изомальтазы, глюкозно-галактозная мальабсорбция.

*С осторожностью:* при заболеваниях, для лечения которых не рекомендуется использование иммуностимулирующих средств (препарат содержит экстракт эхинацеи).

### **Применение у детей**

Эффективность и безопасность ПростаНорма<sup>®</sup> у лиц моложе 18 лет не исследована.

### **Способ применения и дозы**

Внутрь по 1-2 таблетки 3 раза в день за 30 минут до еды или через 40 минут после еды. Продолжительность курса лечения до 6-7 недель. Проведение повторного курса лечения возможно после консультации с врачом.

### **Побочное действие**

Возможны аллергические реакции.

### **Передозировка**

До настоящего времени сведений о случаях передозировки при применении препарата не поступало.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Несовместимости с лекарственными препаратами других групп не выявлено. Лечение может сочетаться с применением биогенных стимуляторов, витаминов, антибактериальных препаратов, массажем предстательной железы и физиотерапевтическими процедурами.

### **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

### **Форма выпуска**

Таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг.

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной или бумаги упаковочной с полиэтиленовым покрытием.

По 30, 50 таблеток в банки светозащитного стекла с треугольным венчиком, укупоренные крышками, натягиваемыми с уплотнительным элементом, или в банки

полимерные для хранения лекарственных средств и витаминов типа БП-30-«Т» или в банки полимерные с контролем первого вскрытия и амортизатором. Свободное пространство в банках заполняют ватой медицинской гигроскопической.

Каждую банку или по 1, 2, 3, 6 или 9 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

**Условия хранения**

При температуре не выше 25 °С, в оригинальной упаковке.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности**

5 лет. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

**Условия отпуска**

Без рецепта.

**Заявитель регистрации (владелец РУ)**

ЗАО «ФПК ФармВИЛАР»

**Производитель**

ООО НПО «ФармВИЛАР»

Россия, 249096, Калужская обл., Малоярославецкий район, г. Малоярославец,  
ул. Коммунистическая, д. 115

**Организация, принимающая претензии:**

ЗАО «ФПК ФармВИЛАР»

117216, Россия, г. Москва, ул. Грина, д. 7

тел./факс. +7 (499) 372-13-23